

## รายการรับวัคซีนของเด็กแต่ละช่วงวัย

อายุ	วัคซีนพื้นฐาน	วัคซีนเสริม	อาการแทรกซ้อน	หมายเหตุ
แรกเกิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ BCG</li> <li>○ ตั๊กแตนเข็มที่ 1</li> </ul>			ถ้ามารดาเป็นพาหะของตับอักเสบบี ควรให้วัคซีนเร็วที่สุด
1 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ตั๊กแตนเข็มที่ 2</li> </ul>			อาจให้ได้เมื่ออายุ 2 เดือน
2 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DTP เข็มที่ 1</li> <li>○ OPV หยดครั้งที่ 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ เยื่อหุ้มสมองอักเสบเข็มที่ 1</li> <li>○ นิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกตเข็มที่ 1 (IPD)</li> </ul>	หลังให้วัคซีน DTP อาจมีไข้ได้ 1-2 วัน	อาจมีการให้วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบพร้อมกับวัคซีน DTP เป็นเข็มเดียว
4 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DTP เข็มที่ 2</li> <li>○ OPV หยดครั้งที่ 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ เยื่อหุ้มสมองอักเสบเข็มที่ 2</li> <li>○ นิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกตเข็มที่ 2 (IPD)</li> </ul>	หลังให้วัคซีน DTP อาจมีไข้ได้ 1-2 วัน	อาจมีการให้วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบพร้อมกับวัคซีน DTP เป็นเข็มเดียว
6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DTP เข็มที่ 3</li> <li>○ OPV หยดครั้งที่ 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ เยื่อหุ้มสมองอักเสบเข็มที่ 3</li> <li>○ นิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกตเข็มที่ 3 (IPD)</li> </ul>	หลังให้วัคซีน DTP อาจมีไข้ได้ 1-2 วัน	อาจมีการให้วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบพร้อมกับวัคซีน DTP เป็นเข็มเดียว
9 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ MMR เข็มที่ 1</li> </ul>		หลังฉีด MMR 5-7 วัน อาจมีไข้ มีผื่น 1-2 วัน	ไม่ควรให้วัคซีน MMR ในเด็กที่แพ้ไข่
12-15 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ JE เข็มที่ 1 และ 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ นิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกตเข็มที่ 4 (IPD)</li> </ul>		JE ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1-4 สัปดาห์
18 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DTP เข็มกระตุ้นที่ 1</li> <li>○ OPV หยดกระตุ้นที่ 1</li> </ul>		หลังให้วัคซีน DTP อาจมีไข้ได้ 1-2 วัน	
2 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ JE เข็มที่ 3</li> </ul>			
3 ปี		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ตั๊กแตนเข็มที่ 1 และ 2</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจให้เมื่ออายุ 4-6 ปี</li> <li>- ตั๊กแตนเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 6-12 เดือน</li> </ul>
4 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DTP เข็มกระตุ้นที่ 2</li> <li>○ OPV หยดกระตุ้นที่ 2</li> </ul>		หลังให้วัคซีน DTP อาจมีไข้ได้ 1-2 วัน	
5-6 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ MMR เข็มที่ 2</li> </ul>		หลังฉีด MMR 5-7 วัน อาจมีไข้ มีผื่น 1-2 วัน	ไม่ควรให้วัคซีน MMR ในเด็กที่แพ้ไข่
6-10 ปี		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ โทฟอยด์</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่แนะนำในเด็กไทย</li> <li>- แนะนำเมื่อจะเดินทางไปในดินแดนที่ระบาด</li> </ul>
10-12 ปี		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ อีสุกอีใส</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน</li> <li>- หากอายุมากกว่า 12 ปี ต้องฉีด 2 เข็มห่างกัน 4-8 สัปดาห์</li> </ul>

**หมายเหตุ :** วัคซีนไขหวัดใหญ่ เป็นวัคซีนเสริม ที่สามารถฉีดในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แต่สำหรับในเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี ควรฉีดครั้งแรก 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน เด็กอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ให้ฉีดครั้งแรกเข็มเดียว หลังจากนั้นจะมีการฉีดซ้ำทุกปี ปีละหนึ่งเข็ม

